

Einordnung der Pflanzengesellschaften Deutschlands nach Formationen in die Gefährdungskategorien (vgl. RENNWALD 2002)

	0	1	2	3	G	R	V	*	D	Gesamt
I. Wasserpflanzengesellschaften	-	16	33	37	1	-	5	22	2	116
II. Felsgesellschaften	-	1	3	2	1	7	5	23	1	43
III. Pioniervegetation	1	2	15	13	-	-	7	29	2	69
IV. Röhrichte und Seggenriede	1	-	4	9	1	-	14	17	1	47
V. Quell- und Moorgesellschaften	-	7	16	13	1	-	1	5	-	43
VI. Strand- und Dünengesellschaften	-	1	5	9	-	1	-	17	4	37
VII. Rasengesellschaften und Wirtschaftsgrünland	-	9	30	45	2	5	9	41	2	143
VIII. Ruderale Staudenvegetation	-	1	5	16	-	4	8	80	1	115
IX. Zwergstrauchgesellschaften und Borstengrasrasen	-	5	12	5	-	4	-	2	1	29
X. Gebüsche und Vorwälder	-	1	5	8	4	-	5	36	9	68
XI. Waldgesellschaften	-	3	12	29	-	9	2	21	2	78
Gesamt										
Anzahl	2	46	140	186	10	30	56	293	25	788
Anteil in [%]	0,3	5,8	17,7	23,6	1,3	3,8	7,1	37,2	3,2	100

Gefährdungskategorien:

0 = Verschwunden oder verschollen

1 = Vom Verschwinden bedroht

2 = Stark gefährdet

3 = Gefährdet

G = Gefährdung anzunehmen

R = Extrem selten

V = Zurückgehend, Gesellschaft der Vorwarnliste

* = Ungefährdet

D = Daten ungenügend

I-XI = Formationsbezeichnung in Kurzfassung