

## FFH-Arten mit veränderten Erhaltungszuständen im Zeitraum 2007 bis 2013

Gruppe	Art	Tatsächliche Veränderung						Veränderung
		atlantisch 2007	atlantisch 2013	kontinental 2007	kontinental 2013	alpin 2007	alpin 2013	
Amphibien	Geburtshelferkröte <i>Alytes obstetricans</i>	unzureichend	schlecht	unzureichend	schlecht			↓
	Gelbbauchunke <i>Bombina variegata</i>					günstig	unzureichend	↓
	Wechselkröte <i>Bufo viridis</i>	unzureichend	schlecht					↓
	Knoblauchkröte <i>Pelobates fuscus</i>	unzureichend	schlecht					↓
	Grasfrosch <i>Rana temporaria</i>	günstig	unzureichend					↓
Käfer	Alpenbock <i>Rosalia alpina</i>					günstig	unzureichend	↓
Fische	Barbe <i>Barbus barbus</i>	unzureichend	günstig					↑
	Steinbeißer <i>Cobitis taenia</i>			unzureichend	günstig			↑
	Bitterling <i>Rhodeus amarus</i>	unzureichend	günstig	unzureichend	günstig			↑
	Äsche <i>Thymallus thymallus</i>	unzureichend	schlecht					↓
Fledermäuse	Breitflügelfledermaus <i>Eptesicus serotinus</i>			günstig	unzureichend			↓
	Rauhhaufledermaus <i>Pipistrellus nathusii</i>			günstig	unzureichend			↓
Schmetterlinge	Großer Feuerfalter <i>Lycaena dispar</i>			unzureichend	günstig			↑
	Blauschillernder Feuerfalter <i>Lycaena helle</i>			unzureichend	schlecht			↓
	Quendel-Ameisenbläuling <i>Maculinea arion</i>			unzureichend	schlecht			↓

Fortsetzung der Tabelle siehe nächste Seite.

Gruppe	Art	Tatsächliche Veränderung						Veränderung
		atlantisch 2007	atlantisch 2013	kontinental 2007	kontinental 2013	alpin 2007	alpin 2013	
Säugetiere	Biber <i>Castor fiber</i>	unzureichend	günstig	unzureichend	günstig			↗
	Wildkatze <i>Felis silvestris</i>			schlecht	unzureichend			↗
	Kegelrobbe <i>Halichoerus grypus</i>	unzureichend	günstig					↗
Moose	Kugel-Hornmoos <i>Notothylas orbicularis</i>			schlecht	unzureichend			↗
Libellen	Zierliche Moosjungfer <i>Leucorrhinia caudalis</i>			schlecht	unzureichend			↗
	Gekielte Smaragdlibelle <i>Oxygastra curtisii</i>			unzureichend	schlecht			↘
	Sibirische Winterlibelle <i>Sympecma paedisca</i>			unzureichend	schlecht			↘
Pflanzen	Herzlöffel <i>Caldesia parnassiifolia</i>			günstig	schlecht			↘
	Sand-Silberschärpe <i>Jurinea cyanoides</i>	unzureichend	günstig	schlecht	unzureichend			↗
Reptilien	Westliche Smaragdeidechse <i>Lacerta bilineata</i>			schlecht	unzureichend			↗
	Mauereidechse <i>Podarcis muralis</i>			unzureichend	günstig	unzureichend	schlecht	↗↘
	Äskulapnatter <i>Zamenis longissimus</i>			schlecht	unzureichend			↗
Sonstige	Edelkrebs <i>Astacus astacus</i>			unzureichend	schlecht			↘
	Steinkrebs <i>Austropotamobius torrentium</i>			unzureichend	schlecht			↘

Quelle: Ellwanger et al. 2014; Darstellung verändert

Stand der Daten: 12.2013

Ausführliche Quelle: Ellwanger, G.; Ssymank, A.; Buschmann, A.; Ersfeld, M.; Frederking, W.; Lehrke, S.; Neukirchen, M.; Raths, U.; Su-kopp, U. und Vischer-Leopold, M. (2014): Der nationale Bericht 2013 zu Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie – ein Überblick über die Ergebnisse. In: Natur und Landschaft 89, 5. S. 185–192.