

## **Zweifarbfliehermaus - *Vespertilio murinus***


### **Verbreitung der Zweifarbfledermaus inklusive Hinweise auf Schwerpunktorkommen**

Das Verbreitungsgebiet der Zweifarbfledermaus erstreckt sich von Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden über Mittel-, Nord- und Osteuropa und Sibirien bis zur pazifischen Küste. Die nördliche Grenze der Verbreitung verläuft etwa entlang des 60. Breitengrades (Strelkov 1999). Im Süden verläuft die Verbreitungsgrenze durch Südosteuropa, den Balkan und Zentralasien. Häufigere Nachweise liegen vor allem für Nordeuropa vor (Hutson et al. 2008). Für die meisten Länder Mittel- und Südeuropas liegen dahingegen nur wenige Informationen vor (Baagøe 2011).

Die erste Wochenstube der Zweifarbfledermaus in Mitteleuropa wurde in Bayern nachgewiesen (Issel et al. 1977). Bis heute sind in Deutschland einzelne Wochenstuben in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Brandenburg und Bayern bekannt. Die Art kommt somit hauptsächlich in den östlichen und südlichen Bundesländern regelmäßiger vor. In den übrigen Landesteilen wurden einzelne bzw. wandernde Tiere oder Männchenkolonien nachgewiesen (Boye 2004, Hozak 2008).

## Zweifarbfliehermaus (*Vespertilio murinus*)

Verbreitung der Art in Deutschland



Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen (1990)  
Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ([www.bkg.bund.de](http://www.bkg.bund.de))