

Osterluzeifalter – *Zerynthia polyxena*

Der Osterluzeifalter ist ein Tagfalter. Er gehört zur Familie der Ritterfalter (Papilionidae).

Merkmale Falter:

- 52-56 mm Flügelspannweite
- sehr charakteristische Zeichnung, auf den Vorder- und Hinterflügeln treten schwarze Zeichnungen in Form von Bögen und lang gezogenen Flecken auf hellgelber Grundfarbe auf
- Auf der Hinterflügeloberseite treten rote, teilweise auch blaue Flecken auf
- Auf den Flügelunterseiten ähnlich, aber stärker rot gezeichnet

Unterscheidung der Falter von anderen Schmetterlingsarten:

- Der Spanische Osterluzeifalter (*Zerynthia rumina*) ist sehr ähnlich, zeigt aber auf der Vorderflügeloberseite eine spezifische Rotzeichnung, die *Z. polyxena* fehlt. Lediglich in Südfrankreich kommen beide Arten gemeinsam vor
- Beide Arten unterscheiden sich weiterhin in der Form der geschwungenen schwarzen Randlinie im Hinterflügel: Auf der Unterseite sind sie beim Osterluzeifalter stärker geschwungen als beim Spanischen Osterluzeifalter
- Nach neuesten Erkenntnissen kommt in Italien südlich des Po eine andere Osterluzeifalter-Art (*Z. cassandra*) vor, während nördlich des Po und im sonstigen Europa *Z. polyxena* gefunden wird (Dapporto 2010)

Merkmale Raupen:

- Die größeren Raupen sind auffallend bunt mit sechs Reihen orangefarbener, behaarter Zapfen bei heller Grundfarbe und schwarzen Flecken



Foto: Tatjana Celik

Raupe des Osterluzeifalters.