

## **Braungrüner Strichfarn - *Asplenium adnigrum***

### **Verbreitung des Braungrünen Strichfarns inklusive Hinweise auf Schwerpunktorkommen**


Das Verbreitungsgebiet des Braungrünen Strichfarns ist mit Ausnahme eines isolierten Vorkommens in Westkanada (Vancouver Island) auf Europa beschränkt (Horn et al. 2001). Das gesamte, zerstreut besiedelte Areal erstreckt sich von Norwegen über Schweden bis Finnland im Norden, im Osten bis zur Slowakei und Polen. Westliche Vorposten liegen in Frankreich, die südlichsten Vorkommen sind aus Griechenland bekannt (Balzer 2006).

In der temperaten bis borealen Zone Europas hat er mehrere Schwerpunktorkommen. Die meisten Vorkommen befinden sich in Polen, Tschechien, Deutschland Frankreich und Österreich (Käsermann 1999).

In Deutschland kommt der Braungrüne Strichfarn nur in den Serpentinegebieten im Nordosten Bayerns und dem Westen Sachsens vor (Vogel & Breckle 1992, Jeßen 2001, Balzer 2006).

## Braungrüner Strichfarn (*Asplenium adulterinum*)

Verbreitung der Art in Deutschland



Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen (1990)  
Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ([www.bkg.bund.de](http://www.bkg.bund.de))