


Frauenschuh - *Cypripedium calceolus*

Verbreitung des Frauenschuhs inklusive Hinweise auf Schwerpunktorkommen

Neben Vorkommen in großen Teilen West-, Zentral- und Ostasiens findet man den Frauenschuh vor allem in der temperaten und borealen Zone Nord-, Mittel- und Osteuropas. In Zentralengland erreicht er seinen westlichen, ozeanisch geprägten Verbreitungsrand. In Deutschland ist die Art relativ weit verbreitet, nimmt allerdings nach Norden hin ab. Sie wächst hauptsächlich in den Mittelgebirgsregionen bzw. der montanen Stufe der Alpen und kommt dementsprechend vor allem in den Bundesländern Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen (Stern 2006) vor. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kommt der Frauenschuh nur vereinzelt vor. Die dortigen Vorkommen grenzen sich vom Hauptverbreitungsgebiet als isolierter Bereich ab. Diese Vorkommen stehen in Zusammenhang mit Vorkommen in Südschweden und dem westlichen Polen und erhalten dadurch besondere Bedeutung. Deutschlandweit gilt der Frauenschuh als gefährdet, in mehreren Bundesländern auch als stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht. Mancherorts sind die Bestände in den letzten Jahrzehnten erloschen, wie etwa im bayerischen Bodenseegebiet oder im westlichen Niedersachsen (Garve 1994).

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

Verbreitung der Art in Deutschland



Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen (1990)
Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)