

Bodensee-Vergissmeinnicht - *Myosotis rehsteineri*

Merkmale:

- Mit einer Höhe von 3 bis 10 cm eher unscheinbar
- Bildet dichte Rasen bzw. lockere Polster von bis zu 30 cm Durchmesser
- Zur Blütezeit im April bis Mai erscheinen die leuchtend himmelblauen, gelegentlich rosafarbenen, 6 bis 12 mm breiten Blüten
- An jedem Blütenstand stehen dicht 5 bis 20 Blüten in einem armlütigen Doppelwickel
- Stängel sind rund und besitzen wenige vorwärts gerichtete, anliegende Haare oder erscheinen ganz kahl
- Lanzettlich bis ovale, 1 bis 3 cm lange Blätter sind beiderseits anliegend und entgegen der Blattspitze behaart
- Bei den Früchten handelt es sich um dunkelbraune, glänzende Klausenfrüchte

Unterscheidung von dem Sumpf-Vergissmeinnicht:

- Blüten bis zu 8 mm breit und damit allgemein kleiner als beim Bodensee-Vergissmeinnicht
- Stängel des Sumpf-Vergissmeinnicht unten abstehend behaart
- Die Blätter des Sumpf-Vergissmeinnicht weisen eine deutlich dichtere Behaarung auf, die im Gegensatz zum Bodensee-Vergissmeinnicht nicht streng vorwärts gerichtet ist
- Sumpf-Vergissmeinnicht wächst weniger stark gedrungen und bildet weniger deutliche Polster