

---

## Vorblattloses Leinblatt - *Thesium ebracteatum*

### Merkmale:

- Mehrjährige Art mit unterirdischer Sprossachse und Ausläuferbildung
- Kann Nährstoffe von anderen Pflanzen abzweigen (Halbparasit)
- Unverzweigte, aufrechte, glatte, unbehaarte Stängel bis 30 cm Höhe
- Beblätterung locker und wechselständig
- Laubblätter kahl, linealisch, schwach dreinervig
- Traubiger Blütenstand mit kurzgestielten, unscheinbaren grünlichen Blüten und einem Tragblatt
- Röhrlige Blüte (fünzfähliges Perigon), an der Spitze eingerollt
- Frucht eiförmig, ledrig, kurz gestielt

Eine Verwechslung ist mit nicht blühenden Trieben des Gewöhnlichen Leinkrauts (*Linaria vulgaris*) oder anderen Arten der Gattung *Thesium* möglich. Die Unterschiede sind meist nur bei blühenden oder fruchtenden *Thesium*-Arten zu erkennen. So besitzt das Vorblattlose Leinblatt, wie das Schnabelfrüchtige Leinblatt (*Thesium rostratum*) nur ein Tragblatt, ihre Verbreitungsgebiete in Deutschland überlappen allerdings nicht, was eine Unterscheidung einfacher macht. Zudem bildet das Vorblattlose Leinblatt lederige Früchte.